

The background features abstract, hand-drawn style swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple small triangles radiating from a central point. The overall aesthetic is clean, modern, and artistic.

# Cours de Géologie BCG, Première Année




# PARTIE I : GEODYNAMIQUE INTERNE

- ✓ STRUCTURE INTRENE DE LA TERRE
- ✓ DERIVE DES CONTINENTS
- ✓ THEORIE DE LA TECTONIQUE DES PLAQUES
- ✓ PALEOMAGNETISME
- ✓ SEISMES
- ✓ VOLCANS
- ✓ CHAINES DE MONTAGNES
- ✓ ROCHES MAGMATIQUES
- ✓ ROCHES METAMORPHIQUES
- ✓ MINERAUX DE L'ECORCE TERRESTRE



# ***STRUCTURE INTERNE DE LA TERRE***

# Structure interne de la Terre




L'intérieur de la Terre est constitué d'une succession de couches de propriétés physiques différentes

Noyau : 17% en volume

Manteau : 81 %

Ecorce ou croûte : 2 %


# Structure interne de la Terre




**discontinuité de Mohorovicic (moho)**, marque un contraste de densité entre la croûte terrestre et le manteau

**discontinuité de Gutenberg**, marque un contraste important de densité entre le manteau et le noyau


## En résumé ...



### — discontinuité de Mohorovicic (MOHO) —



### — discontinuité de Gutenberg —





☐ L'intérieur de la Terre a été établie à partir du comportement des ondes sismiques lors des tremblements de terre.

☐ Les sismologues Mohorovicic et Gutenberg ont réussi à déterminer l'état et la densité des couches par l'étude du comportement des ondes sismiques

☐ La vitesse de propagation des ondes sismiques est fonction de l'état et de la densité de la matière

☐ Il existe deux grands domaines de propagations des ondes :


les ondes de surface qui se propagent à la surface du globe

les ondes de fond qui se propagent à l'intérieur de la terre


les ondes de cisaillement ou ondes S, se propagent dans les solides

les ondes de compression ou ondes P, se propagent dans les solides, liquides et gaz

### Onde P (compression)




### Onde S (cisaillement)



la vitesse de propagation des ondes sismiques est proportionnelle à la densité du matériel dans lequel elles se propagent



La structure interne de la Terre, ainsi que l'état et la densité de la matière, ont été déduits de l'analyse du comportement des ondes sismiques





# ***THEORIE DE LA DERIVE DES CONTINENTS***


## Drive des continents ?

La dérive des continents est une théorie proposée au début du 20ème siècle par le physicien-météorologue A. Wegener, pour tenter d'expliquer la similitude dans le tracé des côtes (par exemple, de part et d'autre de l'Atlantique).




Preuves de Wegener ?

Position actuelle des continents



Parallélisme des lignes côtières entre l'Amérique du Sud et l'Afrique.  
(constatation de le météorologue Wegener depuis 1903)


## La Pangée de Wegener



La reconstitution de Wegener montre que toutes les masses continentales ont été réunies en un seul mégacontinent appelé **Pangée**


## Répartition de certains fossiles

- **Cynognathus**: reptile prédateur terrestre ayant vécu il y a 240 Ma
- ◆ **Mesosaurus**: petit reptile de lacs d'eau douce, il y a 260 Ma
- **Lystrosaurus**: reptile terrestre ayant vécu il y a 240 Ma
- ♣ **Glossopteris**: plante terrestre d'il y a 240 Ma




de part et d'autre de l'Atlantique, sur les continents actuels, existent des fossiles de plantes et d'animaux terrestres datant de 240 à 260 Ma.

**La solution de Wegener**



Ces organismes n'avaient pas la capacité de traverser un si large océan.  
On doit donc concevoir qu'autrefois tous ces continents n'en formaient qu'un seul





La distribution des espèces fossiles est, pour Wegener, un argument préalable. Il cite par exemple, un reptile, le **MESOSAURUS**, dont on retrouve les traces au Brésil et en Afrique du Sud. Datés d'environ 280 millions d'années, les fossiles sont distribués de part et d'autre de l'Atlantique.




Certains fossiles de fougères « **GLOSSOPTERIS** » existent En Amérique du S en Afrique, en Inde, en Australie et en Antarctique.




## Les traces d'anciennes glaciations

→ sens d'écoulement de la glace




- ❖ certaines portions des continents actuels contiennent, des marques de glaciation datant de 250 millions d'années, indiquant que ces portions de continents ont été recouvertes par une calotte glaciaire.
- ❖ Il est improbable de trouver des glaciations sur des continents se trouvant dans la zone tropicale (Afrique du sud et inde)

## La solution de Wegener




le pôle Sud était recouvert d'une calotte glaciaire et l'écoulement de la glace se faisait en périphérie de la calotte




Concordance entre les structures géologiques à l'intérieur des continents :  
Boucliers (2 Ga) et chaînes de montagnes (450 à 650 Ma).

## Solution de Wegener




Concordance entre chaînes de montagnes  
(structures géologiques)

Concordance entre boucliers




Les trois chaînes de montagnes, Appalaches (Est de l'Amérique du Nord), Mauritanides (nord-ouest de l'Afrique) et Calédonides (Iles Britanniques, Scandinavie), ne forment qu'une seule chaîne continue si on rapproche les continents à la manière de Wegener


Age de formation : 470 et 350 Ma




Les contemporains de Wegener n'ont pas été convaincus de cette proposition révolutionnaire de la dérive des continents. Le problème majeur, c'est qu'il ne proposait aucun mécanisme pour expliquer la dérive.



Il démontrait bien que la répartition actuelle de certains fossiles, de traces d'anciennes glaciations ou de certaines structures géologiques soulevaient des questions importantes auxquelles il fallait trouver des explications





Il faut signaler que l'hypothèse de Wegener était une hypothèse génératrice de sciences, parce que les questions soulevées sont suffisamment sérieuses et fondées sur des faits réels pour qu'on s'attaque à y répondre. Mais il aura fallu attendre plus de 40 ans pour que les idées de Wegener refassent surface et qu'on se mette à la recherche du mécanisme de la dérive.




Il avait manqué à Wegener les données fondamentales sur la structure interne de la Terre.






# ***TECTONIQUE DES PLAQUES***



Les déformations de la lithosphère sont reliées aux forces internes de la terre.


Elles se traduisent par le découpage de la lithosphère en plaques rigides qui bougent les unes par rapport aux autres.

Les mouvements se font selon 3 types de limites :  
convergente, divergente & transformante




La convection produit, dans la lithosphère rigide, des forces de tension qui font que les deux plaques divergent. Elle est le moteur qui entraîne la lithosphère océanique de part et d'autre de la dorsale. Entre ces deux plaques divergentes, la venue de magma crée de la nouvelle croûte océanique.

## Gros plan de la zone de divergence



Tensions qui se traduisent par des failles d'effondrement et des fractures ouvertes, ce qui forme un fossé d'effondrement qu'on appelle un rift océanique.

Le magma expulsé, cristallise et forme la nouvelle croûte océanique






**Monterégiennes**

**Chaînon  
de volcans**

## Etape 1

### Amorce d'un rift continental.

Bombement et fracturation.  
Début de volcanisme




L'accumulation de chaleur sous la plaque continentale cause une dilatation de la matière qui conduit à un bombement de la lithosphère.

Les forces de tension fracturent la lithosphère et amorcent le mouvement de divergence. Le magma vient s'infiltrer dans les fissures causant par endroits du volcanisme continental.

## Etape 2

### Rift continental.



La poursuite des tensions produit un étirement de la lithosphère et effondrement en escalier (rift continental).

Création de volcans et d'épanchements de laves le long des fractures.

Exemple : *Grand Rift Africain* en Afrique orientale.






Le Grand Rift africain entaille l'est du continent au sud de la Mer Rouge. Il s'étend, du canal du Mozambique au sud, jusqu'aux bouches de la Mer Rouge au nord; il se divise en deux branches au nord du lac Malawi. On y est à un stade un peu plus avancé que le long du Rio Grande. Déjà des vallées profondes et larges se sont creusées, avec de grands lacs, tel le lac Tanganyika, et de grands volcans (points verts), comme le Kilimanjaro. Progressivement, ces vallées s'élargiront, s'enfonceront et seront envahies par la mer pour former une mer linéaire; d'ailleurs, les eaux marines commencent déjà à

## Etape 3

### Premier plancher océanique - Mer linéaire.



Le rift s'enfonce sous le niveau de la mer et les eaux marines envahissent la vallée. Deux morceaux de lithosphère continentale se séparent et s'éloignent progressivement l'un de l'autre.


La formation de la première croûte océanique basaltique de part et d'autre de la dorsale embryonnaire. Exemple : Mer rouge.






## Etape 4

### Océan de type Atlantique




L'étalement des fonds océaniques conduit à la formation d'un océan de type *Atlantique*, avec sa dorsale bien individualisée, ses plaines abyssales et ses plateaux continentaux correspondant à la marge de la croûte continentale.

*Les dorsales océaniques constituent des zones importantes de dissipation de la chaleur interne de la Terre.*




## Cas de convergence entre deux plaques océaniques



Dans ce genre de collision, une des deux plaques (la plus dense, généralement la plus vieille) s'enfonce sous l'autre pour former une zone de subduction.


## Cas de convergence entre plaques océanique et continentale



La plaque océanique et les sédiments du plancher océanique s'enfoncent dans du matériel de plus en plus dense. le magma expulsé forme une chaîne de volcans sur les continents (arc volcanique continental). le matériel sédimentaire qui se trouve sur les fonds océaniques et qui se concentre au niveau de la zone de subduction pour former un prisme d'accrétion.


Exemple de la marge du Pacifique Est








## Cas de convergence entre deux plaques continentales




L'espace océanique se refermant au fur et à mesure du rapprochement de deux plaques continentales, le matériel sédimentaire du plancher océanique, plus abondant près des continents, et celui du prisme d'accrétion se concentrent de plus en plus; le prisme croît.

## Cas de convergence entre deux plaques continentales (suite)



Tout le matériel sédimentaire est comprimé et se soulève pour former une chaîne de montagnes où les roches sont plissées et faillées  
Toute les grandes chaînes de montagnes plissées ont été formées par ce mécanisme. *Exemple Himalayas*



# Failles Transformantes

Aujourd'hui



Dans 10 millions d'années



Les failles transformantes Permettent d'accommoder des différences dans les vitesses de déplacement entre les plaques et font le relais entre des limites divergentes et convergentes (elles transforment le mouvement entre divergence et convergence).

*Exemple : Faille de San Andreas en Californie, elle assure le relais du mouvement entre la limite divergente de la dorsale du Pacifique-Est, la limite convergente de la plaque Juan de Fuca-Amérique du Nord et la limite divergente de la dorsale de Juan de Fuca.*

# Résumé

➤ Le moteur = mvts de convection dans le manteau, entraînant un flux de chaleur (désintégration des éléments radioactifs)

➤ concentration de la chaleur cause une  
➤ fusion partielle du manteau et une  
➤ expansion des matériaux


➤ L'expansion produit une dorsale médio-océanique

➤ L'écoulement de l'asthénosphère sous la lithosphère rigide entraîne cette dernière ; des tensions se produisent  
Au niveau de la dorsale, causant la divergence et le magmatisme associé

➤ formation continue de nouvelle lithosphère océanique au niveau de la dorsale et élargissement progressif de l'océan

➤ Formation de zones de convergences et de divergences

➤ Les dorsales sont disséquées par des failles dites transformantes pour accommoder des différences de vitesses de divergence.






# ***PALEOMAGNETISME***

La compréhension du magnétisme terrestre a constitué un pas très important dans la formulation de la théorie de la tectonique des plaques.

Deux aspects du magnétisme retiennent l'attention :

- ☐ le paléomagnétisme et les inversions du magnétisme terrestre.
- ☐ La découverte de bandes d'anomalies magnétiques sur les planchers océaniques parallèles aux dorsales est venue renforcer la théorie de l'étalement des fonds océaniques



La terre agit comme un dipôle magnétique, ou encore comme un aimant. Les lignes de forces magnétiques établissent tout autour de la planète un champ magnétique terrestre. C'est la raison pour laquelle l'aiguille d'une boussole s'aligne automatiquement selon les lignes de force, dans une direction nord-sud.



- ✓ Possibilité de calculer la direction et l'intensité du champ magnétique en tout point de la surface du globe par le **Magnétomètre**.
- ✓ Anomalie = différence entre l'intensité mesurée en un lieu donné et l'intensité théorique :
  - Anomalie positive >>> (champ réel > champ théorique)
  - Anomalie négative >>> (champ réel < champ théorique)

## Les laves possèdent une "mémoire magnétique!!!

Le physicien napolitain Macedonio **Melloni** (1853) découvre que chaque roche volcanique possède sa propre aimantation.

L'aimantation a été acquise lors du refroidissement de la lave qui enregistre le champ magnétique terrestre de l'époque.




on peut déterminer la position des pôles magnétiques pour diverses périodes géologiques à partir de roches dont l'âge est connu

## Position du pôle nord magnétique à travers les temps géologiques ?

mesures du paléomagnétisme sur des échantillons datant de l'Éocène au Cambrien, prélevés sur le continent européen

trajectoire établie à partir d'échantillons datant de l'Éocène au Silurien, prélevés sur le continent nord-américain

trajectoire établie à partir d'échantillons datant de l'Éocène au Jurassique, prélevés en Inde



**E**=Éocène (50 Ma); **J**=Jurassique (175 Ma); **T**=Trias (225 Ma); **P**=Permien (260 Ma);  
**Ca**=Carbonifère (320 Ma); **S**=Silurien (420 Ma); **Cb**=Cambrien (530 Ma)

- les trois trajectoires ne coïncident pas; il devrait pourtant n'y avoir qu'une seule trajectoire puisqu'il n'y a qu'un seul pôle nord magnétique terrestre;
  - plus on recule dans le temps, plus le pôle magnétique s'éloigne du pôle géographique
- 

❖ **Il y a eu des dérives continentales plus anciennes,**

❖ aujourd'hui, grâce à la théorie de la tectonique des plaques, On sait que les continents ont bougé tout au long de l'histoire Géologique, et le paléomagnétisme est utilisé comme outil de base pour reconstituer la position des continents aux diverses époques géologiques




les laves ont une mémoire magnétique, et certaines montrent aussi des **inversions du magnétisme** ; c'est-à-dire que le dipôle Nord-Sud a été à certaines époques Sud-Nord.




**Existence d'une dynamo centrale située dans le noyau terrestre.**




Le retournement épisodique du champ magnétique est dû au comportement instable de cette dynamo.




## Utilisation des inversions du champ magnétique terrestre pour construire une échelle magnétostratigraphique




Three balloons (green, blue, and purple) are positioned on the left side of the slide, each with yellow triangular streamers. The green balloon is at the top, the blue one in the middle, and the purple one at the bottom. They are partially cut off by the left edge of the frame.

Comment se construit dans le temps un plancher océanique constitué de bandes parallèles, de polarités magnétiques alternant entre normales et inverses et symétriques de part et d'autre d'une dorsale ?






## Anomalies magnétiques des Planchers océaniques





Lors des premières phases de l'exploration des fonds océaniques, les relevés de l'intensité du champ magnétique à l'aide d'un magnétomètre tiré par un bateau avaient montré l'existence, sur ces fonds, d'une alternance de bandes parallèles de magnétisme faible (polarité inverse) et de magnétisme élevé (polarité normal)




***SEISME***


- 
- Lorsqu'un matériau rigide est soumis à des contraintes de cisaillement, il va d'abord se déformer de manière élastique, puis, lorsqu'il aura atteint sa limite d'élasticité, il va se casser, en dégageant de façon instantanée toute l'énergie qu'il a accumulé durant la déformation élastique. C'est ce qui se passe lorsque la lithosphère est soumise à des contraintes.

- 
- Sous l'effet des contraintes causées le plus souvent par le mouvement des plaques tectoniques, la lithosphère accumule l'énergie. Lorsqu'en certains endroits, la limite d'élasticité est atteinte, il se produit une ou des ruptures qui se traduisent par des failles. L'énergie brusquement dégagée le long de ces failles causent des séismes (tremblements de terre). Si les contraintes se poursuivent dans cette même région, l'énergie va à nouveau s'accumuler et la rupture conséquente se fera dans les plans de faille déjà existants.






**Foyer** le lieu dans le plan de faille où se produit réellement le séisme  
**Épicentre** désigne le point à la surface terrestre à la verticale du foyer.










## Les Plaques lithosphériques

limites divergentes      limites convergentes      limites transformantes




- 
- Dans une région donnée, des séismes se produiront à plusieurs reprises le long d'une même faille, puisque cette dernière constitue un plan de faiblesse dans la lithosphère.
  - les séismes ne se produisent que dans du matériel rigide. Par conséquent, les séismes se produiront toujours dans la lithosphère, jamais dans l'asthénosphère qui est plastique.

### Onde P (compression)




Les **ondes P** sont des ondes de compression, se propagent dans tous les états de la matière. Les particules se déplacent selon un mouvement avant-arrière dans la direction de la propagation de l'onde.

### Onde S (cisaillement)




Les **ondes S** sont des ondes de cisaillement se propagent que dans les solides. Les particules oscillent dans un plan vertical, à angle droit par rapport à la direction de propagation de l'onde.

### Onde L (de Love) (cisaillement)



Les **ondes L** sont des ondes de cisaillement, comme les ondes S, mais qui oscillent dans un plan horizontal

### Onde de Rayleigh



Les **ondes de Rayleigh** sont assimilables à une vague ; les particules du sol se déplacent selon une ellipse, créant une véritable vague qui affecte le sol lors des grands tremblements de terre.


# Les échelles de mesure

2 types d'échelles ont été utilisées :


- L'échelle d'intensité de Mercalli

L'échelle de magnitude de Richter



ÉCHELLE D'INTENSITÉ DE <b>MERCALLI</b>	MAGNITUDE À L'ÉCHELLE <b>RICHTER</b>
<b>I</b> Séisme perçu uniquement par quelques personnes dans des circonstances particulières; détecté seulement par des instruments très sensibles.	<b>2</b>
<b>II</b> Perçu par quelques personnes au repos et se trouvant aux étages supérieurs; balancement d'objets suspendus.	<b>3</b>
<b>III</b> Perçu principalement par des personnes à l'intérieur des édifices. Les automobiles stationnées peuvent bouger.	
<b>IV</b> Perçu par la plupart des gens à l'intérieur des édifices et par certains à l'extérieur; suffisant pour réveiller certaines personnes. Bruits de vaisselle, fenêtres et portes.	<b>4</b>
<b>V</b> Perçu par presque tout le monde; plusieurs personnes sont réveillées. Bris de vaisselle et de fenêtres; les objets instables sont renversés.	<b>5</b>
<b>VI</b> Perçu par tout le monde; plusieurs personnes sont effrayées et courent à l'extérieur; quelques meubles sont déplacés; quelques morceaux de plâtre tombent et quelques dommages aux cheminées. Dommages légers.	
<b>VII</b> La plupart des gens paniquent et courent à l'extérieur; dommages minimes aux constructions conçues pour les zones sismiques, de minimes à moyens chez les bonnes constructions ordinaires, importants chez les mauvaises constructions. Meubles renversés.	<b>6</b>
<b>VIII</b> Dommages légers aux constructions conçues pour les zones sismiques, importants chez les bonnes constructions ordinaires avec des effondrements possibles, catastrophiques chez les mauvaises constructions.	<b>7</b>
<b>IX</b> Dommages considérables aux constructions conçues pour les zones sismiques. Édifices déplacés sur leurs fondations. Fissuration du sol. Bris des canalisations souterraines.	
<b>X</b> Quelques bonnes constructions en bois et la plupart des constructions en maçonnerie sont détruites. Sol fortement fissuré. Plusieurs glissements de terrain se produisent.	<b>8</b>
<b>XI</b> Très peu de constructions en maçonnerie restent debout; rails tordus; ponts détruits. Grandes fissures dans le sol.	<b>9</b>
<b>XII</b> Destruction quasi totale. Ondulations visibles à la surface du sol. Objets projetés dans les airs.	



## Énergie dégagée au Foyer




Avec une progression arithmétique de la magnitude, l'énergie dégagée au foyer croît de manière Exponentielle :  
*un séisme de magnitude 8, n'est pas 25% plus fort qu'un séisme de magnitude 6, mais 1000 fois plus fort.*



Les ondes P se propagent plus rapidement que les ondes S  
Les ondes sismiques sont enregistrées en plusieurs endroits  
du globe par des appareils qu'on nomme sismographes




Temps de propagation (minutes)



Pour connaître le lieu du séisme à la surface de la terre, il faut au moins trois enregistrements.







**Figure 2.10** Worldwide seismic activity. The dots represent the epicenters of significant earthquakes. It is apparent that the locations of the great majority of earthquakes correspond to the boundaries between plates. (After Bolt, 1988.)



Tsunami ?




En japonais, tsunami vient de tsu « port » et nami « vague ».


Un tsunami est constitué par le déplacement rapide et d'une hauteur variable d'une importante masse d'eau, mise en mouvement par le déclenchement d'un séisme.

Le tsunami se propage à partir du lieu de la secousse, traversant l'océan à une vitesse qui peut atteindre 800 km/h. Au large, les tsunamis font rarement plus de 1 m de haut, mais, en approchant des côtes, leur amplitude augmente : le mur d'eau peut s'élever jusqu'à 30 m de haut.


# Tsunami et raz de marée : catastrophe consécutive à un séisme




Soulèvement du fond marin, suite à séisme, engendre un gonflement de la surface de l'océan. Ce gonflement donne lieu à une vague de surface



La première vague de tsunami approche, il se produit d'abord un retrait de la mer.



Première vague arrive



Un second retrait, puis d'une arrivée d'autre vague et ainsi de suite




## Tsunami en Asie du 25 décembre 2004

La catastrophe qui a touché l'Asie le 25 décembre 2004 a été provoquée par le plus violent séisme enregistré dans le monde depuis 40 ans.





Les Tsunamis ont été ressentis jusqu'aux côtes d'Afrique de l'est à plus de 6 000 kilomètres.

Le tsunami qui a frappé le sud-est asiatique a couvert plus de 2 200 km en trois heures. Les vagues abordent les côtes à une vitesse de 30 à 40 km/h.

La hauteur de cette masse d'eau de plusieurs centaines de kilomètres de long est comprise entre 10 et 30 m.




tion  
urgence  
entre













## SISMICITÉ EURO-MÉDITERRANÉENNE : 1963-1993, SÉISMES DE MAGNITUDE > 4



Source : Lambert et al.,  
Les tremblements de terre en France, 1997

Alger, 2003 = Seisme de 6.7 Richeter  
2000 morts

Al Asnam, 1980 = Seisme  
3500 morts




## NORTHERN ALGERIA


2003 05 21 18:44:19 UTC 36.89N 3.78E Depth: 10.0 km, Magnitude: 6.7

Seismicity 1990 to Present, Plate Boundaries in Yellow

USGS National Earthquake Information Center



La côte nord de l'Algérie est traversée par une limite de plaques lithosphériques continentales convergentes : la plaque eurasiennne, au nord, chevauche la plaque africaine au sud. C'est dans cette faille de chevauchement que se déclenchent les séismes de la région.



Là où les deux plaques lithosphériques rigides entrent en collision et se courbent, les fractures dans la lithosphère produisent des séismes de faible profondeur.

L'enfoncement de la plaque rigide dans l'asthénosphère plastique s'accompagne de ruptures et fractures dans cette plaque, ce qui déclenche des séismes intermédiaires et des séismes profonds.



**les séismes se produisent surtout  
aux frontières des plaques lithosphériques**

### **séismes superficiels**


qui se produisent en faible profondeur  
( $< 10\text{km}$ ) qui se retrouvent autant aux  
frontières divergentes qu'aux frontières  
convergentes

### **séismes intermédiaires**

qui se produisent en profondeur de 10 à 100km  
au voisinage des limites convergentes


### **séismes profonds**

qui se produisent en grande profondeur  
(jusqu'à 700km) au voisinage des limites  
convergentes




*Exemple la zone de convergence Kouriles-Japon  
dans le nord-ouest du Pacifique*

Dorsale  
médio-océanique



A la **divergence de plaques**, la lithosphère océanique dépasse rarement les 10-15 km ce qui fait qu'il ne peut y avoir que des séismes superficiels.

A green balloon is in the top-left corner, and a purple balloon is in the bottom-left corner. Both have yellow streamers and small yellow triangular flags.


Même si la grande majorité des séismes se situe aux frontières des plaques il existe d'autres activités sismiques intra plaque, c'est à dire à l'intérieur même des plaques lithosphériques.

Par exemple, les séismes associés aux volcans sur les plaques océaniques et les séismes intra plaques continentales qui sont plus difficile à expliquer.





***VOLCANS***





# Volcanisme de dorsale

Il existe des volcans sous-marins tout le long des dorsales, particulièrement dans le rift central, là où il se forme de la nouvelle lithosphère océanique.

Exemple : Islande, île volcanique assise sur la dorsale océanique de l'Atlantique nord et qui est formée uniquement de volcans.



# Volcanisme de zone de subduction

Le volcanisme relié à l'enfoncement d'une plaque sous l'autre va former des chaînons de volcans.


Selon qu'il s'agisse d'une collision entre deux plaques océaniques, ou entre une plaque océanique et une plaque continentale, la nature du volcanisme diffère :

Dans le cas où il y a convergence entre deux plaques océaniques, on a formation d'un arc insulaire (chaînon de volcans dans l'Océan).

Dans le cas où il y a convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale, on formation d'un arc continental (chaînon de volcans sur le continent).

# Arc continental


la plaque de Juan de Fuca plonge sous la plaque nord américaine, donnant ainsi naissance aux volcans de la Chaîne des Cascades.




# Volcanisme de point chaud

Le volcanisme de point chaud est un volcanisme intraplaque, qu'on retrouve principalement, mais pas exclusivement, sur les plaques océaniques.

Il provient de d'une concentration locale de la chaleur qui provoque une fusion partielle du manteau.




Exemple de ce type de volcanisme : îles de Hawaii



Si une plaque lithosphérique se déplace au-dessus d'un point chaud (zone de subduction) qui fonctionne sporadiquement, il se construit un chaînon de volcans. Les volcans les plus vieux se situent à l'extrémité du chaînon, alors que les plus jeunes se situent à proximité du point chaud.

Ce volcanisme est un indicateur de déplacement de la lithosphère océanique.

## Exemple : chaînon des îles Hawaii








# ***CHAINES DE MONTAGNES***

Marge continentale passive

Prisme sédimentaire




- ✓ Sur la **marge continentale passive**, comme par exemple celle de l'Atlantique actuelle, s'accumule sur le plateau continental et à la marge du continent un prisme de sédiments provenant de l'érosion du continent.
- ✓ En s'éloignant de plus en plus de la zone de divergence, la lithosphère devient de plus en plus dense

Marge continentale active

prisme d'accrétion

Zone d'obduction

Arc volcanique




- ✓ Sous la poussée du *tapis roulant* et l'augmentation de la densité, cette lithosphère se fracture et une partie s'enfonce sous l'autre
- ✓ On passe d'une situation de **marge passive** à une situation de **marge continentale active**. Au large du continent, il se forme un arc volcanique insulaire.
- ✓ Le chevauchement progressif de la plaque océanique sur ce qui reste de plaque océanique du côté continental concentre le matériel qui se trouve sur les fonds océaniques pour former un prisme d'accrétion qui croît à mesure de la fermeture entre l'arc volcanique et le continent

Chevauchement, soulèvement  
et déformation des sédiments  
d'eau profonde


Zone  
d'obduction

Batholithes  
et plutons

Lambeaux de  
croûte océanique



La collision entre l'arc volcanique et le continent crée un chevauchement important de tout le matériel du prisme d'accrétion sur la marge continentale. L'activité ignée cesse et de grandes masses de roches ignées (en rouge) peuvent rester coincées dans la lithosphère.




- ✓ la poursuite du mouvement concentre encore plus de matériel et forme une chaîne déformée que l'on qualifie de **chaîne de montagnes immature**
- ✓ La marge de cette chaîne immature peut se transformer en une nouvelle zone active (**subduction**), ce qui permet à la collision de se poursuivre et instaure du volcanisme d'arc continental sur la nouvelle chaîne.


Un exemple de cette dernière situation est la Cordillère des Andes, reliée à la collision de la plaque océanique de Nazca et la partie continentale de la plaque de l'Amérique du Sud

## Les Plaques lithosphériques


limites divergentes      limites convergentes      limites transformantes



# chaîne de montagnes mature



- ❖ La chaîne de montagnes mature est formée par la collision entre deux plaques continentales
- ❖ Le rapprochement des 2 plaques continentales conduit à la formation d'un prisme d'accrétion qui croît progressivement




Exemple : Himalayas  
(collision entre l'Inde et l'Asie)

- ❖ Avec la collision des deux plaques (Eurasie et Australie) et la cessation du mouvement, la chaîne a atteint sa hauteur maximum et acquis ses caractéristiques
- ❖ Il y aura une zone de roches non déformées à côté des roches déformées de la chaîne, parfois de façon symétrique de part et d'autre de la chaîne





# ***ROCHES MAGMATIQUES***


The background features abstract, flowing shapes in light green, light blue, and light purple. Scattered throughout are several small, yellow triangles of varying sizes, some pointing towards the center and others towards the edges, creating a dynamic, sunburst-like effect.

Un **magma** est un mélange pâteux, plus ou moins fluide, de matières minérales en fusion, provenant des zones profondes de la terre (**manteau**), où les roches sont soumises à des pressions et à des températures très élevées.

Après refroidissement, il donne naissance à des roches de type plutonique ou intrusive (**Gabbro**) ou à des roches de type éruptif ou extrusif (**Basalte**).

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it. The green balloon is at the top, the blue one in the middle, and the purple one at the bottom.

# Cristallisation Fractionnée




au cours du refroidissement progressif du magma, il cristallisation des assemblages minéralogiques dans un ordre bien défini : **ultramafiques**, **mafiques**, **intermédiaires** et **felsiques**. Ces quatre assemblages définissent quatre grands types de roches ignées.

# Caractéristiques des silicates


MINÉRAL		FORMULE CHIMIQUE IDÉALISÉE	CLIVAGE	RÉSEAU CRISTALLIN
OLIVINE		$(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$	Aucun	Tétraèdre isolé (B)
Groupe des PYROXÈNES		$(\text{Mg,Fe})\text{SiO}_3$	2 plans à angle droit	Chaîne simple (C)
Groupe des AMPHIBOLES		$(\text{Mg,Fe})_7\text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$	2 plans (60° et 120°)	Chaîne double (D)
Micas	MUSCOVITE	$\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	1 plan	Couche planariaire (E)
	BIOTITE	$\text{K}(\text{Mg,Fe})_3\text{Si}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2$		
FELDSPATH	ORTHOCLASE	$\text{KAlSi}_3\text{O}_8$	2 plans à 90°	Réseau en 3 dimensions
	PLAGIOCLASE	$(\text{Ca,Na})\text{AlSi}_3\text{O}_8$		
QUARTZ		$\text{SiO}_2$	Aucun	

## Exemple cristallisation d'un magma qui refroidit dans une chambre magmatique



Les premiers minéraux à cristalliser seront évidemment les minéraux de haute température, **olivine d'abord, pyroxènes et amphiboles ensuite**. Ces cristaux vont se former dans le magma et vont sédimenter vers la base de la chambre magmatique pour former une roche riche en olivine, pyroxène et amphibole, une roche ignée mafique, un gabbro par exemple.

Le liquide résiduel (restant) sera donc appauvri en ces minéraux; on aura donc un magma de composition différente de sa composition initiale. Ce magma aura une composition intermédiaire.





Si ce magma est introduit dans une chambre secondaire et qu'il poursuit son refroidissement, les premiers minéraux à cristalliser seront **les amphiboles, les biotites, le quartz et certains feldspaths plagioclases**, ce qui produira une roche ignée intermédiaire, une diorite par exemple (roche ignée "B")


Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it. The green balloon is at the top, the blue one in the middle, and the purple one at the bottom.

# **Fusion Partielle**



- 
- A decorative background on the left side of the slide featuring a large, stylized sun with yellow rays and a green face at the top. Below the sun are several balloons in light blue, light purple, and yellow, with yellow streamers trailing behind them.
- La fusion partielle est l'inverse du processus de cristallisation fractionnée. Si on augmente progressivement la température d'un matériel solide composé d'un assemblage de minéraux silicatés, cet assemblage passe entièrement ou partiellement de la phase solide à la phase liquide.
  - comme dans le cas du refroidissement d'un magma où tous les minéraux ne cristallisent pas tous en même temps, ceux-ci ne fondent pas non plus tous en même temps lorsqu'ils sont chauffés.
  - A une pression donnée, le point où un minéral passe de sa phase solide à sa phase liquide est sa **température de fusion**.


- 
- Les premiers minéraux à fondre sont les minéraux de basse température : le quartz, les feldspaths potassiques et sodiques, et la muscovite
  - La fusion n'est alors que partielle, puisqu'on obtient un mélange de solide et de liquide.
  - Si ce liquide est extrait du mélange et remobilisé (introduit le long de fractures ou dans une autre chambre par exemple), ce magma felsique formera, en cristallisant, des rhyolites ou des granites




- Au cours de l'augmentation de la température, il se produit une séparation en deux phases, une phase liquide et une phase solide, soit des cristaux solides qui baignent dans un liquide.




- la composition des phases solides et liquides change avec l'évolution thermique.



- Le liquide peut être extrait et remobilisé par des processus naturels (le long de fractures ou dans une autre chambre par exemple) à n'importe quel stade de l'évolution thermique, ce qui fait qu'on obtient des magmas de composition variées.

Three balloons are visible in the left margin: a green one at the top, a light blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it.

**Comment tout cela s'applique dans les principales zones où il y a du magmatisme, soit aux dorsales océaniques, dans les zones de subduction et aux points chauds ?**



**séquence ophiolitique ou Ophiolites**



# Séquence Ophiolitique


La croûte océanique (5-15Km) montre quatre zones :

- des cumulats lités ou stratifiés composés de gabbro, la stratification résulte de l'action combinée de la convection et de l'accumulation des cristaux de haute température à la base de la chambre magmatique,
- des gabbros massifs issus de la cristallisation aux parois de la chambre magmatique,
- un complexe filonien, niveau caractérisé par les dykes et filons gabbroïques dus à la cristallisation dans les fractures de tension,
- les basaltes issus des épanchements volcaniques. Cette croûte océanique fait de 5 à 15 km d'épaisseur.

Three balloons (green, blue, and purple) are positioned in the top-left corner of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it, creating a festive, celebratory feel.

# **Magmatisme de Zone de Subduction : cas de l'arc insulaire**

## Arc insulaire




➤ L'enfoncement d'une plaque sous l'autre entraîne des sédiments riches en minéraux de basses températures comme le quartz ( $\text{SiO}_2$ ), mais aussi les feldspaths et les argiles (micas).

➤ En profondeur, il y a fusion partielle, et le matériel fondu est un mélange de :

- \* la péridotite de la lithosphère inférieure,
- \* la croûte basaltique-gabbroïque de la lithosphère supérieure,
- \* les minéraux de basses températures des sédiments entraînés dans la subduction.





Contrairement aux zones de dorsales où la fusion partielle de péridotite ne pouvait donner qu'un magma mafique, ici la fusion partielle de ces trois entités qui contiennent tous les types de silicates pourra fournir des magmas de composition variée.


**Il peut se faire une ségrégation des magmas intermédiaires lorsque les températures atteintes**

**seront intermédiaires, ce qui produit les volcans andésitiques des arcs insulaires, ou encore si les températures de fusion atteignent des niveaux plus élevées, on produit des magmas mafiques alimentant des coulées de laves basaltiques en surface.**

Three balloons in green, blue, and purple are positioned in the top-left corner of the slide. Each balloon has a small yellow starburst graphic next to it. The balloons are tied with thin, wavy lines.

# Magmatisme de Zone de Subduction : le cas de l'Arc Continental

# Arc continental




La fusion partielle affecte ici la péridotite de la lithosphère inférieure, la croûte basaltique-gabbroïque de la lithosphère supérieure et les minéraux de basses températures des sédiments (plus important en volume).




- Dans les premières phases de la fusion partielle, on produit des magmas **intermédiaires** et même par endroits des magmas **felsiques**.

- Dans les phases plus chaudes, on produit des magmas **mafiques** qui peuvent alimenter des plateaux de basalte.




- Dans ces croûtes continentales épaisses, on accumulera aussi des grands stocks **granitiques** qui peuvent correspondre aux fusions de basses températures et qui à cause de leur faible fluidité ne pourront parvenir jusqu'à la surface.



Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it. The green balloon is at the top, the blue one in the middle, and the purple one at the bottom.

# Magmatisme de Point Chaud

## Point chaud




Ce magmatisme provient de la fusion partielle de la péridotite du manteau. Le magma est donc un magma mafique qui produit des volcans basaltiques comme ceux des îles Hawaii ou de la Polynésie

Three balloons in green, blue, and purple are positioned in the top-left corner of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it.


# Activité magmatique et ses produits

A




L'expression en surface de ce magmatisme est généralement minime en volume par rapport au magma sous-jacent qui lui donne naissance et qui formera les grands corps intrusifs

## STRUCTURES ISSUES DU MAGMATISME



Les roches ignées étant plus résistantes à l'érosion que les roches sédimentaires encaissantes, les corps magmatiques forment des reliefs positifs

## STADE ÉROSIF AVANCÉ



stade plus avancé d'érosion où ont été mis à nu les grands batholites, souvent granitiques



Three balloons are visible on the left side of the slide: a green one at the top, a blue one in the middle, and a purple one at the bottom. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it.

# Les Volcans

- 
- Il existe deux cas extrêmes de volcans :

les volcans qui crachent des laves très fluides

les volcans qui crachent peu ou pas de laves

- Un faible contenu en silice donne des magmas fluides,

**Exemple : magma mafique**

**Volcan-boucliers**


- Un contenu élevé en silice augmente de beaucoup la viscosité des magmas qui ont alors peine à s'écouler

**Exemple : magma felsique**

**Stratovolcans**

- Entre les deux il y a des intermédiaires


## VOLCAN-BOUGLIER



- Alimentation magmatique est mafique, contenant peu ou pas de silice, produisant des laves basaltiques
- se manifeste aux dorsales océaniques, aux points chauds et possiblement associé à certaines zones de subduction
- Exemple **Islande** (médio océanique), **Hawai** (point chaud)



## STRATOVOLCAN





• Ces volcans associés aux zones de subduction, principalement dans les arcs volcaniques continentaux.

• Le stratovolcan est stratifié, dû aux dépôts pyroclastiques successifs

• Le magma est si riche en silice qu'il n'arrive pas à s'écouler hors du volcan

• Le volcan crache des gaz et du matériel pyroclastique

• Les gaz qu'il contient construisent une pression qui croît, jusqu'à l'explosion

• Le matériel est pulvérisé et, mélangé aux gaz, crée un nuage dense très chaud (jusqu'à 800° C), se déplaçant à une vitesse de 150Km /h

• Les cendres qui sont éjectées dans la haute atmosphère, jusqu'à des altitudes d'une vingtaine de kilomètres et qui ensuite sont dispersées tout autour de la planète







# ***ROCHES METAMORPHIQUES***




# Métamorphisme ?

- Les roches métamorphiques sont issues de la transformation à l'état solide de roches ignées ou sédimentaires sous l'effet de température et/ou de pressions élevées.
- Deux grands types de métamorphisme :
  - le métamorphisme de contact
  - le métamorphisme régional.


## *Métamorphisme de contact*

Le métamorphisme de contact est celui qui se produit dans la roche encaissante au contact d'intrusifs



# *Métamorphisme Régional*

Affecte de grandes régions et est à la fois contrôlé par des augmentations importantes de pression et de température



Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it. The green balloon is at the top, the blue one in the middle, and the purple one at the bottom.


# Principaux minéraux de l'écorce terrestre

## Éléments chimiques les plus abondants dans la croûte terrestre.


Oxygène (O)	46,6 *	~75 %
Silicium (Si)	27,7	
Aluminium (Al)	8,1	
Fer (Fe)	5,0	
Calcium (Ca)	3,6	
Sodium (Na)	2,8	
Potassium (K)	2,6	
Magnésium (Mg)	2,1	
... les autres	1,5	

Lors de la formation de la terre, les éléments légers, comme l'oxygène et le silicium ont migré vers l'extérieur (**formation des silicates**), alors que les éléments plus lourds, comme le fer, se sont concentrés au centre

# Structure de base des silicates




Structure de base  
des silicates




Le tétraèdre de base

## Représentation du tétraèdre de base



Vue de côté




Vue du haut

# Caractéristiques des silicates



MINÉRAL		FORMULE CHIMIQUE IDÉALISÉE	CLIVAGE	RÉSEAU CRISTALLIN
OLIVINE		$(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$	Aucun	Tétraèdre isolé (B)
Groupe des PYROXÈNES		$(\text{Mg,Fe})\text{SiO}_3$	2 plans à angle droit	Chaîne simple (C)
Groupe des AMPHIBOLES		$(\text{Mg,Fe})_7\text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$	2 plans (60° et 120°)	Chaîne double (D)
Micas	MUSCOVITE	$\text{KAl}_2(\text{AlSi}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2$	1 plan	Couche planariaire (E)
	BIOTITE	$\text{K}(\text{Mg,Fe})_3\text{Si}_3\text{O}_{10}(\text{OH})_2$		
FELDSPATH	ORTHOCLASE	$\text{KAlSi}_3\text{O}_8$	2 plans à 90°	Réseau en 3 dimensions
	PLAGIOCLASE	$(\text{Ca,Na})\text{AlSi}_3\text{O}_8$		
QUARTZ		$\text{SiO}_2$	Aucun	

tétraèdres isolés reliés par des ions métalliques :  
Exemple : Olivine






# Chaînes simples reliées par des ions métalliques : Exemple : Pyroxène






# Chaînes doubles reliées par des ions métalliques :

## Exemple : Amphiboles




INOSILICATES

# Couches reliées par des ions métalliques : Exemple : Micas (Argiles)



# Tétraèdres reliées par des oxygènes : Quartz




Pas de plan de faiblesse donc pas de clivage : résistants

TECTOSILICATES

# Carbonates

La calcite est un minéral qui constitue les calcaires

les  $(\text{CO}_3)^{2-}$  sont liés par des  $\text{Ca}^{2+}$  pour former une structure rhomboédrique typique de ce minéral




## Tableau présentant les minéraux les plus communs dans les principaux groupes et leurs usages

GROUPE	MINÉRAL	FORMULE	USAGE
ÉLÉMENTS NATIFS	Or Argent Cuivre Diamant Graphite Soufre Platine	Au Ag Cu C C S Pt	échange, joaillerie joaillerie, photographie conducteurs électriques gemmes, abrasifs mines à crayons, lubrifiants médicaments, produits chimiques catalyseurs, alliages
OXYDES	Hématite Magnétite Corindon	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	minerai de fer minerai de fer gemme, abrasif
SULFURES	Galène Sphalérite Pyrite Chalcopyrite Bornite Cinabre	PbS ZnS FeS <sub>2</sub> CuFeS <sub>2</sub> Cu <sub>5</sub> FeS <sub>4</sub> HgS	minerai de plomb minerai de zinc "or des fous" minerai de cuivre minerai de cuivre minerai de mercure
SULFATES	Gypse Anhydrite Barite	CaSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O CaSO <sub>4</sub> BaSO <sub>4</sub>	plâtre et panneaux plâtre et panneaux boue de forage
CARBONATES	Calcite Dolomite Malachite Azurite Rhodochrosite	CaCO <sub>3</sub> CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> Cu <sub>2</sub> (OH) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> Cu <sub>3</sub> (OH) <sub>2</sub> (CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> MnCO <sub>3</sub>	ciment Portland ciment Portland minerai de cuivre, joaillerie minerai de cuivre, joaillerie joaillerie
SILICATES	quartz talc amiante kaolinite	SiO <sub>2</sub> Mg <sub>3</sub> Si <sub>4</sub> O <sub>10</sub> (OH) <sub>2</sub> Mg <sub>6</sub> Si <sub>4</sub> O <sub>10</sub> (OH) <sub>8</sub> Al <sub>4</sub> Si <sub>4</sub> O <sub>10</sub> (OH) <sub>8</sub>	verre, horlogerie, calculatrices poudre pour bébés isolant céramique
HALOGÉNURES	Halite Fluorite Sylvite	NaCl CaF <sub>2</sub> KCl	sel commun fabrication des aciers fertilisants
HYDROXYDES	Limonite Bauxite	FeO(OH).nH <sub>2</sub> O Al(OH) <sub>3</sub> .nH <sub>2</sub> O	minerai de fer, pigment minerai d'aluminium



# ***ROCHES SEDIMENTAIRES***

## ALTÉRATION DES MATÉRIAUX & ÉROSION



Processus conduisant à la formation des roches sédimentaires:

- l'altération des matériaux ;
- le transport de ces particules ;
- la sédimentation de ces particules ;
- la diagenèse.



A decorative graphic on the left side of the slide features three balloons in light green, light blue, and light purple, each with yellow triangular streamers. The title text is positioned to the right of the green balloon.

## Sources du matériel sédimentaire

- Source **terrigène ou détritique** : l'érosion du continent;
- Source **Biologique (allochimique)**  
fragment d'organisme « coquilles » ;
- Source **chimique (orthochimique)** :  
précipités chimiques dans le bassin de sédimentation  
ou à l'intérieur du sédiment durant la diagenèse.



# L'altération

trois types:

- Mécaniques ou physique : gel, racines d'arbres, T°
- Chimiques : eau de pluie (hydratation)
- Biologiques : certains organismes attaquent biochimiquement les minéraux pour chercher les éléments nutritifs



# Transport

- Surtout l'eau qui assure le transport des particules , vent et la glace
- Le transport des particules peut être très long
- Selon le mode et l'énergie du transport, le sédiment résultant comportera des structures sédimentaires variées




# La sédimentation

- Tout le matériel transporté s'accumule dans un bassin de sédimentation pour former le dépôt
- Les sédiments se déposent en couches successives dont la composition, la taille des particules, la couleur, etc., varient dans le temps selon la nature des sédiments apportés




# La Diagenèse

- La diagenèse englobe tous les processus chimiques et mécaniques qui affectent un dépôt sédimentaire après sa formation



CIMENTATION PRÉ-COMPACTION





COMPACTION ET CIMENTATION



# Nom des sédiments et roches sédimentaires

La dénomination des sédiments et roches sédimentaires se fait en deux temps :

- 
- 
- **taille des particules** (granulométrie) chez les roches terrigènes et Biologiques
  - Ensuite, on complète la classification par la **composition minéralogique**



## Les Terrigènes

	Sédi ment	Roche
2 mm	Gravier	CONGLOMÉRAT
0,062 mm	Sable	GRES grès à quartz = orthoquartzite grès à feldspath = arkose
	Boue	MUDSTONE (Shale)

## Les Allochimiques (calcaires)

	Sédi ment	Roche
2 mm	Gravier	CALCIRUDITE
0,062 mm	Sable	CALCARÉNITE
	Boue	CALCILUTITE

## Les Orthochimiques

DOLOMIE:  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$   
SEL:  $\text{NaCl}$   
GYPSE:  $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$   
CHERT:  $\text{SiO}_2$




A decorative graphic on the left side of the slide featuring three balloons in green, light blue, and purple, each with yellow streamers and small yellow triangular flags.

Comment donner un âge à  
une roche ?

# Temps Géologique

En géologie, le temps est le plus souvent matérialisé par une séquence de roches, représenté ici schématiquement par cette colonne de roches.





## Datations Relatives

- permettent d'établir l'âge des couches ou des corps géologiques les uns par rapport aux autres :
- entre deux corps géologiques, on établie qui le plus jeune et qui le plus vieux, sans donner un âge absolu



# Datations Relatives

- Il y a deux grands groupes de méthodes de datation relative :

1. les méthodes physiques

2. les méthodes paléontologiques

# Méthodes physiques de datation relative




Le concept de Steno (1669) qui présente deux principes intimement liés apparaît simpliste, mais il est fondamental: les couches sédimentaires se sont d'abord déposées à l'horizontale (principe de l'horizontalité primaire); les couches se sont superposées les unes sur les autres, ce qui implique que celle qui est en-dessous d'une autre est plus vieille que cette dernière (principe de la superposition).

- **Principe de l'horizontalité primaire** des couches sédimentaires
- **Principe de superposition.**

# Méthodes physiques de datation relative


- **Principe de recoupement:** un corps rocheux qui en recoupe un autre est nécessairement plus jeune que celui qu'il recoupe.



Ici, l'âge relatif des couches 1, 2 et 3 est fourni par le principe de superposition. Les intrusifs 4, 5 et 6 sont plus jeunes que les couches sédimentaires horizontales dans lesquelles ils se sont introduits. De plus, comme le dyke 5 recoupe le dyke 4 et que l'intrusif 6 recoupe le dyke 5, on sait que 6 est plus jeune que 4, même si ces deux dykes ne se recoupent pas; l'ordre d'intrusion est donc 4, 5 et finalement 6.


# Méthodes physiques de datation relative

- la **discordance d'érosion** représente aussi du temps géologique, mais du temps où, non seulement il n'y a pas eu de dépôt, mais où il y a eu érosion, suppression de dépôt.




Cette situation implique que le granite a été exposé un jour à l'action de l'érosion et que les particules de granite arrachées au massif par l'érosion ont été incorporées dans le sédiment qui a recouvert le massif. Nécessairement, l'intrusif est plus vieux que les couches sédimentaires sus-jacentes.

# Discordance angulaire




## Dépôt

Les couches sédimentaires se déposent à l'horizontale




## Plissement et soulèvement

Il est fréquent que les forces tectoniques de compression plissent ces couches originellement horizontales



## Érosion

Les couches plissées sont subséquemment érodées et les reliefs aplanis



## Nouveau dépôt

Si d'autres couches se déposent au-dessus, par exemple à la faveur d'un envahissement par la mer, il en résulte une relation d'angularité entre les deux ensembles. La surface qui sépare les deux ensembles est une discordance angulaire.







# Méthodes paléontologiques de datation relative


- Chaque temps géologique était caractérisé par un assemblage de fossiles caractéristique
- Deux couches ont le même âge si elles refferment le même assemblage de fossiles.

Photo de famille




Soit un assemblage de fossiles (A, B, C, D et E)  
qui se trouve dans une même couche


CARBONIFÈRE	Supérieur
	Inférieur
DÉVONIEN	Supérieur
	Moyen
	Inférieur
SILURIEN	Supérieur
	Inférieur
ORDOVICIEN	Supérieur
	Moyen
	Inférieur



# Echelle relative des temps géologiques

ÈRES	PÉRIODES	ÉPOQUES	Extinctions majeures
CÉNOZOÏQUE	QUATERNAIRE	Holocène (récent) Pléistocène	
	TERTIAIRE	Pliocène Miocène Oligocène Éocène Paléocène	
MÉSOZOÏQUE (Secondaire)	CRÉTACÉ		←
	JURASSIQUE		←
	TRIAS		←
PALÉOZOÏQUE (Primaire)	PERMIEN		←
	CARBONIFÈRE		←
	DÉVONIEN		←
	SILURIEN		←
	ORDOVICIEN		←
	CAMBRIEN		←
PRÉCAMBRIEN	PROTÉROZOÏQUE	NÉO-	←
		MÉSO-	
		PALÉO-	
	ARCHÉEN		

- 
- Il n'y a aucun temps exprimé en nombre d'années
  - Les limites entre les principales unités ont été établies principalement sur des changements fauniques importants (flèches rouges)
  - la limite entre le Mésozoïque et le Cénozoïque correspond à la disparition de plusieurs groupes dont les dinosaures



Chaque période géologique porte un nom qui lui a été donné au 19<sup>e</sup> siècle par les géologues de l'Europe de l'Ouest ou de Grande Bretagne : le Cambrien (Cambria, le nom romain du Pays de Galles), l'Ordovicien et le Silurien (d'après le nom des tribus Ordovices et Silures, qui vivaient au pays de Galles durant la conquête romaine), le Dévonien (d'après le Devonshire Country en Angleterre où ces roches furent étudiées pour la première fois), le Carbonifère (roches riches en charbon), le Permien (d'après la province de Perm, en Russie, où ces roches furent étudiées pour la première fois), le Trias (roches qui se divisent en trois unités en Europe), le Jurassique (d'après le Jura en France et en Suisse où des roches de cet âge furent étudiées pour la première fois), le Crétacé (creta, mot latin pour craie; appliqué pour la première fois à des falaises blanches le long de la Manche).



# ***DATATIONS RADIOMETRIQUES***


# Datations Radiométriques

- les méthodes de datation relatives, principalement par les fossiles, n'ont pas permis d'obtenir une idée du temps géologique réel
- la datation radiométrique, utilise certains éléments chimiques qui ont la propriété de se désintégrer radioactivement
- En calculant le temps qu'a mis une certaine portion d'un élément contenu dans un minéral à se désintégrer, on obtient l'âge de formation de ce minéral.





**Qu'est-ce que la radioactivité?**



**Masse atomique = noyau = nombre de protons (+) + nombre de neutrons (-)**

**Numéro atomique = nombre de protons (+)**


**La radioactivité est due à l'instabilité du noyau qui se désintègre par émission d'énergie, principalement sous deux formes:**

**particule  $\alpha$  = 2 protons (+) + 2 neutrons ( $\pm$ ) ::**


**particule  $\beta$  = 1 électron (-) :**

Exemple :

Désintégration de l'uranium 238 ( $^{238}\text{U}$ ) en plomb 206 ( $^{206}\text{Pb}$ )



Masse  
atomique




Numéro atomique

PARENT


temps



REJETON



- La valeur du rapport R sur P est donc fonction du temps de désintégration
- Le taux de désintégration est différent d'un type de désintégration à l'autre, mais toujours le même pour une désintégration donnée

Three balloons in light green, light blue, and light purple are positioned in the top-left corner of the slide. Each balloon has a small yellow starburst above it. The text is centered on the slide.

Comme on connaît bien les constantes de désintégration pour les diverses réactions qu'on utilise couramment, on est capable de calculer le temps de désintégration pour une valeur donnée du rapport  $R$  sur  $P$ , à l'aide de ces constantes



# Exemple pratique

- Soit un minéral « Zircon » ( $\text{ZrSiO}_4$ ). Dans ce minéral, une certaine quantité du zirconium « Zr » peut être remplacée par l'uranium, ce qui rend le minéral utile pour les datations
- L'uranium va commencer, à ce moment, à se désintégrer radioactivement
- En déterminant le rapport plomb sur uranium (rejeton/parent) par analyse en spectrométrie de masse dans un zircon donné, lequel zircon se trouve par exemple dans un granite, on peut calculer depuis combien de temps se fait la désintégration ou, en d'autres termes, depuis combien de temps a cristallisé le zircon (l'âge de formation du granite)




## Exemples de désintégrations couramment utilisées

PARENT	REJETON	DEMIE-VIE
238 Uranium	206 Plomb	4,5 milliards d'années
87 Rubidium	87 Strontium	47 milliards d'années
40 Potassium	40 Argon	1,3 milliards d'années
14 Carbone	14 Azote	5730 années






Three balloons (green, blue, and purple) are positioned vertically on the left side of the slide. Each balloon has a string and several small yellow triangular flags attached to it.


**Carbone-14?**

- 
- Le carbone qui est présent majoritairement a une masse atomique de 12 : le  $^{12}\text{C}$ . En effet, il représente 98,89% de la proportion totale ! Afin de former du  $\text{CO}_2$ , ce carbone se combine au dioxygène de l'atmosphère : cela donne du  $^{12}\text{CO}_2$ .
  - Mais il existe aussi du carbone 13, et bien sûr du carbone 14 ! Ces différents carbones sont appelés des isotopes, car ils détiennent le même nombre de protons mais leur nombre de neutrons diffèrent.  
Il existe deux types d'isotopes :
    - **le carbone 12 (98,89%) et le carbone 13 (1,108%) sont dit "stables"** : ils ne sont pas radiocatifs.
    - **le carbone 14 (seulement  $1,2 \times 10^{-12}$ ) qui est radioactif**, qui peut donc être utilisé dans les datations grâce à ses propriétés particulières

# Comment le C14 est présent dans les êtres vivants

- Les gaz de la haute atmosphère sont bombardés par les rayons cosmiques : l'azote, qui est le principal composant de ces gaz, qui a une masse atomique de 14 ( $^{14}\text{N}$ ), se transforme alors en  $^{14}\text{C}$ , puis se combine avec le dioxygène pour former du  $^{14}\text{CO}_2$ . Ce  $^{14}\text{CO}_2$  se mélange alors au  $^{12}\text{CO}_2$ , qui vient des volcans ou même de la combustion d'hydrocarbures, et est par la suite "capté" par tous les organismes vivants.
- La photosynthèse des végétaux nécessite en effet du  $\text{CO}_2$  atmosphérique, mélange de  $^{12}\text{CO}_2$  et de  $^{14}\text{CO}_2$ , et tous les animaux ou êtres humains consomment ces végétaux. **Ainsi tous les corps organiques terrestres contiennent du carbone 14, en infime quantité, et c'est seulement ce carbone qui sera utilisé dans les datations radioactives.**




- 
- Le  $^{14}\text{C}$  est en effet une méthode très utile pour la datation de certains matériaux géologiques, et particulièrement de matériaux archéologiques.
  - La méthode utilise la réaction de désintégration du carbone-14 en azote-14

Temps 0



Après 5730 ans



Après 11460 ans



Après 17 190 ans

$\frac{1}{8}$


22 920 ans

$\frac{1}{16}$

74 490 ans

$\frac{1}{8192}$



- 
- l'âge que l'on obtient avec la méthode du  $^{14}\text{C}$ , c'est l'âge de la mort de l'organisme (du bois, des coquillages, de la tourbe, des tissus de lin, coton, laine, etc...).
  - la proportion  $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$  a changé avec le temps géologique d'où correction
  - cette méthode ne s'applique qu'aux **matériaux qui ont déjà été vivants**, comme du bois, des coquilles, du lin, etc
  - Avec le  $^{14}\text{C}$ , la demie-vie est de 5730 ans
  - Le  $^{14}\text{C}$  une méthode très utile en archéologie et en histoire
  - La méthode est aussi utilisée en géologie des dépôts superficiels qui souvent sont plus jeunes que la limite de 75 000 ans